

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LAGUNA  
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO**

**Edital 003/2015  
MÉDICO GINECOLOGISTA-OBSTETRA**



**FAEPESUL**  
FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL

**Junho/2015**



**AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA**  
**LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.**

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
  - a) este **CADERNO DE PROVAS** com 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Matemática e 20 (vinte) questões Específicas para o cargo de **MÉDICO GINECOLOGISTA-OBSTETRA**, sem repetição ou falha.
  - b) 1(um) **CARTÃO RESPOSTA**.
2. Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e o seu número de inscrição conferem com os que aparecem no **CARTÃO RESPOSTA**. Caso contrário, notifique o fato **IMEDIATAMENTE** ao fiscal.
3. Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do **CARTÃO RESPOSTA**, com caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul.
4. Tenha muito cuidado com o **CARTÃO RESPOSTA**, para não o **DOBRAR, AMASSAR** ou **MANCHAR**.
5. **SERÁ ELIMINADO** deste Concurso Público o candidato que:
  - a) Se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consultas de qualquer espécie.
  - b) Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo **CADERNO DE PROVA** e/ou **CARTÃO RESPOSTA**.
  - c) Se recusar a entregar o **CADERNO DE PROVAS** e/ou o **CARTÃO RESPOSTA** quando terminar o tempo estabelecido.
  - d) Não assinar a **LISTA DE PRESENÇA** e/ou o **CARTÃO RESPOSTA**.
6. O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após **1(uma)** hora contada a partir do efetivo início.
7. O **CADERNO DE PROVAS** não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer momento.
8. Quando terminar, entregue ao fiscal, sob pena de eliminação, o **CADERNO DE PROVAS** e o **CARTÃO RESPOSTA**.
9. O tempo disponível para realização desta prova é de **4 (quatro)** horas, estando compreendido, neste período, o preenchimento do **CARTÃO RESPOSTA**.
10. As questões desta Avaliação estarão disponíveis, no primeiro dia útil após a sua realização no endereço eletrônico: **[www.fapesul.org.br/concursos](http://www.fapesul.org.br/concursos)**.

**Boa Prova!**

### Texto para as questões de 1 a 3:

“(…) Nos 176 países e territórios onde o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento trabalha diariamente, muitas pessoas desfavorecidas suportam um duplo fardo de privações. São mais vulneráveis aos efeitos mais amplos da degradação ambiental, devido a pressões mais fortes e a menos meios para as enfrentar. Têm também de lidar com as ameaças ao seu ambiente imediato decorrentes da poluição do ar interior, da água suja e do saneamento rudimentar. As previsões sugerem que o continuado insucesso na redução dos riscos ambientais graves e das crescentes desigualdades sociais ameaça abrandar décadas de progresso sustentado da maioria pobre da população mundial – e até inverter a convergência global do desenvolvimento humano.

As grandes disparidades de poder dão forma a estes padrões. Análises recentes mostram como os desequilíbrios de poder e as desigualdades de gênero ao nível nacional estão ligados à redução do acesso à água potável e saneamento melhorado, à degradação das terras e às mortes provocadas pela poluição do ar interior e exterior, amplificando os efeitos associados às disparidades do rendimento. As desigualdades de gênero também interagem com os resultados ambientais, agravando-os. Ao nível global, é frequente que as disposições governamentais enfraqueçam as vozes dos países em vias de desenvolvimento e excluam os grupos marginalizados.

Contudo, existem alternativas à desigualdade e à insustentabilidade. O crescimento impulsionado pelo consumo de combustíveis fósseis não é um pré-requisito para uma vida melhor em termos de desenvolvimento humano mais gerais. Os investimentos que melhoram a equidade (por exemplo, no acesso a energias renováveis, água e saneamento e nos cuidados de saúde reprodutiva) podem promover a sustentabilidade e o desenvolvimento humano. Responsabilização mais sólida e processos democráticos, em parte através do apoio a uma sociedade civil e a meios de comunicação social mais ativos, também podem melhorar os resultados. (…).

O provimento de oportunidades e opções para todos é o objetivo central do desenvolvimento humano. Temos uma responsabilidade coletiva para com os menos privilegiados entre nós, atualmente e no futuro, em todo o mundo – e o imperativo moral de assegurar que o presente não seja inimigo do futuro.”

**Fonte:** PNDU – Relatório do Desenvolvimento Humano da ONU 2011. IN: <http://www.pnud.org.br/hdr/Relatorios>.

**1. Com base na leitura do texto acima, pode-se afirmar que o tema proposto para reflexão nesse relatório da Organização das Nações Unidas é:**

- A) Riscos da degradação ambiental.
- B) Promoção do desenvolvimento humano.
- C) Consequências da poluição do ar.
- D) Causas das desigualdades sociais.
- E) Responsabilidade dos meios de comunicação social.

**2. Segundo o texto, no mundo há muitas pessoas desfavorecidas. O Relatório cita vários fatores que contribuem com essa situação tão degradante. Assinale, então, qual das alternativas abaixo NÃO corresponde ao que diz o relatório:**

- A) Marginalização e exclusão social.
- B) Prejuízos ambientais.
- C) Saneamento rudimentar.
- D) Globalização e mercado de trabalho.
- E) Desigualdade e insustentabilidade.

**3. De acordo com as reflexões feitas, se forem devidamente atendidas as populações menos privilegiadas, teremos cumprido nossa responsabilidade coletiva. Isso significa:**

- A) Processos democráticos.
- B) Redução dos riscos ambientais.
- C) Igualdade de gêneros.
- D) Investimentos em energias renováveis.
- E) Provimento do desenvolvimento humano.

**4. Considerando o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinale a alternativa que está de acordo com o que prescrevem as regras.**

- A) enxaqueca – piquenique – privilégio.
- B) impecilho – liláz – granizo.
- C) acessor – argila – taboada.
- D) cochichar – geito – discreção.
- E) magestade – paralizar – bazar.

5. Na Nova Ortografia, o uso do hífen muda, desaparecendo em algumas palavras compostas. Assim sendo, assinale a alternativa em que o emprego hífen está equivocado, segundo as regras gramaticais atualizadas.

- A) auto-retrato.
- B) anti-inflamatório.
- C) auto-estima.
- D) ultra-som
- E) micro-organismo.

6. No período: "Embora não existam dados globais sobre o número de mulheres que trabalham na silvicultura, os indícios sugerem que as mulheres com menos opções ocupacionais e menor mobilidade, dependem mais das florestas do que os homens", a oração sublinhada é classificada como:

- A) Subordinada Adverbial Comparativa.
- B) Subordinada Adverbial Temporal.
- C) Subordinada Adverbial Consecutiva.
- D) Subordinada Adverbial Final.
- E) Subordinada Adverbial Concessiva.

**Texto para as questões 7 e 8:**

“Uma exposição magnífica em Londres mostra que os gregos não apenas souberam enxergar o belo na forma humana: eles definiram por meio da arte o que é belo, e nos ensinaram a vê-lo com seus olhos”

(Revista Veja, 22 de abril de 2015).

7. Segundo a Sintaxe, o trecho sublinhado no período acima é um exemplo de oração, que assim deve ser classificada:

- A) Subordinada Substantiva Objetiva Direta.
- B) Subordinada Substantiva Predicativa.
- C) Subordinada Adjetiva Explicativa.
- D) Subordinada Adverbial Causal.
- E) Coordenada Sindética Explicativa.

8. A expressão “Uma exposição magnífica em Londres”, de acordo com a análise sintática, exerce a função de:

- A) sujeito composto.
- B) sujeito simples.
- C) objeto direto.
- D) objeto indireto.
- E) agente da passiva.

9. A pontuação gráfica é responsável por marcar as pausas e a entonação da fala, a fim de contribuir com a clareza e a correção do enunciado. Com base nisso, assinale a alternativa que está de acordo com essas regras da Língua Portuguesa:

- A) “A economia chinesa desacelera, e atinge as exportações do Brasil.”
- B) “No século passado, nossa humanidade, viveu três tragédias sem precedentes.
- C) “Um especialista diz que o erro dos pais é achar que disciplina é punição.”
- D) “O Santo Sudário, o tecido que teria envolvido o corpo de Jesus no sepulcro será exibido em Turim em uma rara visitação pública.”
- E) “A internet, somada à câmera de smartphones, inaugurou uma era em que tudo, pode ser gravado e compartilhado...”.

10. Em se tratando de correção gramatical, observe se as regras da concordância nominal são respeitadas nas seguintes frases. Feito isso, assinale a alternativa que obedece a essas regras.

- A) Motivação sempre é boa para começar mais um dia de trabalho.
- B) Anexo aos documentos pessoais, seguiam as cópias das provas em revisão.
- C) Os desabrigados conseguiram bastante alimentos e produtos de higiene.
- D) Já era meio-dia e meia quando todos chegaram da caminhada.
- E) Mesmo aprovada em primeiro lugar, ela parecia meia descontente com a conquista de um cargo tão importante.

## MATEMÁTICA

---

11. O valor da expressão  $x = \sqrt{16 + 9} + \sqrt[10]{0} + \sqrt[15]{1} - \sqrt[4]{81} + 1^{0,35}$  é:

- A)  $-\sqrt{3}$
- B) 0
- C) 2
- D) -2
- E) 4


12. Em um grupo de  $n$  amigos, 60% são homens e os demais 40% estão representados por 12 mulheres. Esse grupo decidiu visitar o maior número possível de asilos em sua cidade, para isto teriam de se dividir em equipes com o mesmo número de pessoas e cada equipe seria formada apenas por pessoas do mesmo sexo. Assim, atendendo as condições determine o número de asilos visitados por esse grupo.

- A) 7
- B) 4
- C) 6
- D) 5
- E) 8

13. Assinale a alternativa INCORRETA:

- A) 10% de 20% de 1.200 é igual a 24
- B) Se  $a \cdot b = 0$  então  $a = 0$  ou  $b = 0$ , para  $a$  e  $b$  números reais quaisquer.
- C) Se  $a \cdot b = a \cdot c$  então  $b = c$ , para  $a, b$  e  $c$  números reais quaisquer.
- D)  $2^{3^2} = 2^9 = 512$
- E)  $\sqrt{64\%} = 0,8$

14. Considere o quadrado ABCD e o retângulo EFGH, cujas medidas estão expressas em *cm*, conforme a figura abaixo:



Assinale a alternativa que apresenta o valor de  $X$  para que o retângulo tenha área igual à do quadrado.

- A) 13 *cm*
- B) 26 *cm*
- C)  $21 + \sqrt{3}$  *cm*
- D)  $26 + 7\sqrt{3}$  *cm*
- E)  $5 + 8\sqrt{3}$  *cm*



15. Considere as proposições:

( )  $\sqrt[5]{96} = 2\sqrt[5]{3}$

( )  $\sqrt{\sqrt[3]{729}} = 3$

( )  $\sqrt{13 + \sqrt[3]{27}} = 4$

( )  $\sqrt[4]{77 + \sqrt{13 + \sqrt{7 + \sqrt[5]{32}}}} = 3$

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

A) V – V – V – V

B) V – F – F – V

C) F – V – V – V

D) F – F – V – V

E) V – V – V – F

16. Sr. Antônio acreditando que seu país vivera um momento de ascensão econômica investiu seu dinheiro em uma operação financeira de alto risco. Entretanto, um escândalo de corrupção fez com que seu investimento sofresse uma retração de 40%, ou seja, o investidor acabara de perder 40% do que tinha investido. Em seguida, com um novo cenário econômico, Sr. Antônio recuperou 30% do valor que perdera com o escândalo, e decidiu imediatamente “sacar” o valor de sua aplicação. Nestas condições, determine a porcentagem que representa a perda do valor investido.

A) 20%

B) 10%

C) 18%

D) 28%

E) 25%

17. Assinale a alternativa CORRETA:

A)  $\sqrt{2,25} = 0,15$

B)  $mmc(1, n) = 1$ , para qualquer  $n \in \mathbb{N}$ .

C) O número 210 possui 32 divisores inteiros.


D) Se  $r$  e  $s$  são números racionais, então  $\frac{r}{s}$  é também um número racional.

E)  $(10\%)^2 = 100\%$

18. Assinale a alternativa que apresenta o valor de  $4^{0,5} + 256^{0,25} + 1^{0,333...} - 32^{0,2} + 3^{1/2}$ :

- A)  $\sqrt{3}$
- B)  $9 + \sqrt{3}$
- C) 6,5
- D)  $1 + \sqrt{3}$
- E)  $5 + \sqrt{3}$

19. Determine a área de um quadrado de lado  $x$  cm, sabendo que o perímetro, isto é, a soma de todos os seus lados, é igual a  $4\sqrt{13} - 8$  cm.



- A)  $17 - 4\sqrt{13}$  cm
- B) 17 cm
- C) 15 cm
- D)  $272 - 64\sqrt{13}$  cm
- E) 144 cm

20. D. Joana decidiu pintar sua casa e contratou Sr. Valdair. O pintor mencionou que ele usa a tinta “x”, por ser de melhor qualidade e, portanto a relação custo/benefício seria satisfatória, uma vez que uma lata de 3,6 litros é o suficiente para pintar  $12 m^2$  de parede. D. Joana, auxiliada por Valdair, efetuaram algumas medições e constataram que a área a ser pintada é de  $528 m^2$ . Assim, sendo R\$ 87,50 o valor de cada lata de tinta, e tendo o custo de mão-de-obra de R\$ 3.300,00, determine o valor total a ser pago por D. Joana.

- A) R\$ 7.250,00
- B) R\$ 7.000,00
- C) R\$ 7.150,00
- D) R\$ 6.875,00
- E) R\$ 7.600,00

## ESPECÍFICAS

---

**21. Uma gestante primigesta, com mais de 30 anos de idade durante o terceiro trimestre de gestação refere: dor, dormência ou formigamento no polegar, no indicador, no dedo médio e no lado radial do dedo anular no aspecto palmar. Esse quadro clínico remete ao diagnóstico de:**

- A) Artrite reumatoide.
- B) Dor no ligamento redondo.
- C) Tendinite.
- D) Síndrome do túnel carpal.
- E) Compressão do nervo ulnar.

**22. No que se refere a infecção urinária na gravidez, assinale a alternativa INCORRETA:**

- A) O aumento do conteúdo de glicose, aminoácidos e vitaminas na urina da gestante faz com que se forme um meio mais propício para o crescimento bacteriano.
- B) A ação miorelaxante da progesterona sobre a musculatura ureteral, associada a compressão mecânica do útero sobre os ureteres favorece a estase urinária.
- C) O diagnóstico é realizado pela cultura de urina com o crescimento inferior a 100 mil ou mais colônias por mililitro de urina, coletada por jato inicial em paciente com sintomas urinários.
- D) A presença de bactérias com fímbrias na urina da gestante é um fator predisponente para infecção urinária alta.
- E) *Citrobacter*, *Pseudomonas* e *Escherichia coli* são algumas das bactérias comumente associadas a ITU na gestante.

**23. De acordo com o Manual Técnico de Pré-Natal e Puerpério do Ministério da Saúde, são atribuições do profissional médico no atendimento de pré-natal na atenção básica de saúde:**

- I - Realizar o cadastramento da gestante no SisPreNatal e fornecer o Cartão da Gestante devidamente preenchido devendo o cartão deve ser verificado e atualizado a cada consulta.
- II - Realizar a consulta de pré-natal de gestação de baixo risco intercalada com a presença do(a)enfermeiro(a).
- III - Desenvolver atividades educativas, individuais e em grupos (grupos ou atividades de sala de espera).
- IV – Manter atendimento de pré-natal para gestantes de baixo a alto risco.
- V - Realizar visitas domiciliares durante o período gestacional e puerperal, acompanhar o processo de aleitamento e orientar a mulher e seu companheiro sobre o planejamento familiar.

**Estão CORRETOS os itens apontados na alternativa:**

- A) I, II e III.
- B) II, IV e V.
- C) II, III e V.
- D) I, II, III e V.
- E) II, III e IV.

**24. A infecção puerperal é um termo utilizado para descrever qualquer infecção bacteriana após o parto. Analisando as afirmativas abaixo assinale a(s) alternativa(s) correta(a).**

I - Endometriometrite é a forma clínica mais frequente de infecção puerperal, associada ou não a FO, episiotomia ou parede abdominal.

II - Exames complementares direcionam a escolha do tratamento antimicrobiano.

III - Excesso de toques vaginais, uso de anestesia e anemia pós-operatória são alguns dos fatores de risco para a infecção puerperal.

IV - No tratamento para a endometriometrite pós cesárea a clindamicina associada a aminoglicosídeo é a terapêutica de primeira escolha.

V - A falha no tratamento antimicrobiano para a endometriometrite pós-parto com persistência de picos de temperatura acima de  $37,5^{\circ}\text{C}$  pode sugerir a presença de restos placentários retidos no útero.

**Estão CORRETOS os itens apontados na alternativa:**

- A) I, III e IV.
- B) I, II e V.
- C) III, IV e V.
- D) I, IV e V.
- E) I, III e V.

**25. Calcula-se a data provável do parto levando-se em consideração a duração média da gestação normal (280 dias ou 40 semanas, a partir da DUM), mediante a utilização de calendário. Outra forma, seria através da utilização de um gestograma, ou ainda, utilizando o cálculo através da chamada Regra de Nägele. Para tanto, utilizando a Regra de Nägele, qual seria a data provável do parto para uma gestante com DUM 27/01/15?**

- A) 01/11/15.
- B) 03/11/15.
- C) 02/11/15.
- D) 04/11/15.
- E) 05/11/15.

**26. Presença de sangramento vaginal intermitente, geralmente de pequena intensidade, indolor e, por vezes, acompanhado da eliminação de vesículas. A altura uterina geralmente incompatível para a idade gestacional, presença de hiperêmese é mais acentuada, podendo levar a estados de desidratação e distúrbios hidroeletrólíticos, podendo ainda haver presença de hipertensão arterial precoce. São achados clínicos que remetem a:**

- A) Doença trofoblástica gestacional.
- B) Hemorragia.
- C) Aborto.
- D) Gravidez ectópica.
- E) Patologia do colo uterino.

**27. Perda sanguínea por via vaginal, súbita, de cor vermelha viva, de quantidade variável, não acompanhada de dor. Geralmente episódica, recorrente e progressiva. No exame obstétrico identifica-se volume e tono uterinos normais e frequentemente apresentação fetal anômala, batimentos fetais geralmente mantidos. A gestante poderá estar apresentando:**

- A) Aborto.
- B) Descolamento prematuro de placenta.
- D) Doença trofoblástica gestacional.
- C) Hemorragia.
- E) Placenta prévia.

**28. Consiste em terapia medicamentosa que tem se mostrado segura e indicada durante a gestação quando tem-se PA sistólica maior que 160 mmHg e/ou diastólica maior do que 105 mmHg:**

- A) Labetalol.
- B) Hidralazina.
- C) Metildopa.
- D) Losartana.
- E) Captopril.

**29. Referente ao HIV na gestação, assinale a alternativa INCORRETA:**

- A) As mulheres que receberam anti-retrovirais durante a gestação e o parto somente para a profilaxia da transmissão vertical e que apresentam carga viral menor que 1000 cópias/mL e CD4 maior que 350cél/mm<sup>3</sup> poderão interromper o uso dos medicamentos logo após o parto.
- B) O uso da nevirapina durante o trabalho de parto pode induzir a resistência, impossibilitando sua posterior utilização.

- C) O efeito do AZT sobre a carga viral do HIV não é o único fator responsável para a redução da transmissão vertical.
- D) A contagem de CD4 materno apresentou um melhor valor preditivo do que a carga viral em relação a prematuridade.
- E) Fármacos como hidroxiuréia, efavirenz e zalcitabina podem estar indicados na terapia anti-retroviral para gestante.

**30. Relacione os dados estabelecendo a classificação prognóstica da eclampsia.**

- 1 - Eclampsia não complicada  
2 - Eclampsia complicada  
3 - Eclampsia descompensada

- ( ) Hemorragia cerebral  
( ) Coagulopatia  
( ) Coma  
( ) Insuficiência renal aguda  
( ) Convulsão sem outras complicações  
( ) Ictericia

**A sequencia CORRETA de cima para baixo está na alternativa:**

- A) 3, 2, 3, 2, 1, 2.  
B) 2, 3, 2, 3, 2, 3.  
C) 3, 1, 2, 3, 3, 2.  
D) 3, 3, 3, 2, 1, 2.  
E) 3, 2, 3, 3, 1, 2.

**31. A maioria dos sinais e sintomas típicos do climatério resulta da diminuição dos níveis dos estrogênios circulantes. Relacionado a este período da mulher, leia atentamente as questões e após desenvolva o que se pede.**

I - Os fogachos consistem no mais frequentes distúrbios do climatério. O FSH acima de 40mu/ml e o estradiol abaixo de 20pq/ml podem confirmar diagnóstico de pós menopausa.

II - Os sangramentos menstruais abundantes acometem cerca de 20% das mulheres, principalmente na fase pré – menopausa. A maioria dos sangramentos que ocorrem é consequência de distúrbios hormonais e na grande maioria das vezes por hiperplasia endometrial.

III - É no apogeu da perimenopausa que ocorrem as modificações psico - afetivas entre as mulheres, período que apresenta um maior número de disfunções sexuais pela diminuição da lubrificação e atrofia da mucosa vaginal, isto relacionado ao hiperestrogenismo na região vulvar.

IV - Para abordagem a mulher para identificação da fase de menopausa, nas pacientes histerectomizadas com sintomas, pode-se dosar FSH (três dosagens com intervalos de uma semana).

V - A mulher em período climatérico deve ser vista como um todo. Os hormônios empregados nesta fase podem variar de acordo com a análise do médico, mais basicamente incluem o estrogênio, progesterona e os androgênios.

**Dos itens acima, assinale a alternativa que contempla os itens CORRETOS.**

- A) Apenas a III e V.
- B) Apenas a II e III.
- C) Apenas I e IV.
- D) Apenas a I.
- E) Apenas a I e III.

**32. De acordo com a OMS, a classificação das formas de abortamento tem a intenção de orientar as condutas clínicas necessárias. Sobre o abortamento leia atentamente as afirmativas coloque nas questões V (verdadeiro) quando a afirmação for correta e F (falso) quando a afirmação for falsa. Após assinale a questão que contempla a ordem correta das alternativas.**

( ) O aborto infectado e séptico é caracterizado pela infecção ovular, com ou sem disseminação para a circulação materna. É uma complicação clínica que pode acompanhar qualquer estágio do abortamento.

( ) Gestação anembrionada se caracteriza pela ausência de vesícula vitelínica ou de embrião no interior do saco gestacional com IG entre 5 e 7 semanas. Na ultrassonografia, a vesícula vitelínica deve ser vista em um saco gestacional com menos de 20mm e o embrião, a partir de 15mm.

( ) A probabilidade de evolução da ameaça para o abortamento espontâneo é de aproximadamente 50%, sendo maior naquelas pacientes que apresentam sangramentos por mais de 3 dias.

( ) Em caso de abortamento incompleto e inevitável, pode-se quando no segundo trimestre utilizar 400µG de misoprostol via vaginal a cada quatro horas até a eliminação do feto. O tempo médio para expulsão é de cerca de 18 horas.

( ) Para evitar erros éticos e legais a chance de ter feito um diagnóstico de abortamento em uma gravidez ectópica sempre existe. Não se deve presumir que a gravidez tenha sido intra-uterina só porque a paciente fez uma curetagem pós aborto.

**A ordem CORRETA de cima para baixo está apresentado na alternativa:**

- A) V, F, F, V, V.
- B) V, F, V, F, V.
- C) F, V, F, V, F.
- D) V, F, V, V, V.
- E) F, F, V, F, V.

**33. Referente a doença hemolítica perinatal, leia atentamente e assinale o que se pede:**

I - Para cada antígeno eritrocitário haverá potencial para o desenvolvimento de doença hemolítica, se o feto tiver o antígeno e a mãe não o possuir, se o anticorpo materno produzido for da classe IgG e se tal anticorpo cruzar a placenta em quantidade suficiente para causar hemólise.

II - A exposição materna ao sangue fetal pode ocorrer de forma espontânea ou traumática, ocorrendo assim no momento do parto, descolamento prematuro da placenta, amniocentese, cordocentese, manipulação obstétrica, gestação ectópica exclusivamente.

III - Para que ocorra uma resposta imunológica à incompatibilidade Rh-D e o feto seja acometido, a mãe deve ter sido sensibilizada em alguma ocasião anterior, seja em transfusões sanguíneas incompatíveis em gestações prévias ou até mesmo em sua vida fetal.

IV - A cordocentese infelizmente acarreta um risco significativo de complicações, como infecção, sangramento, bradicardia fetal, ruptura das membranas ovulares e a morte fetal.

**Dos itens acima a alternativa que contempla as informações INCORRETAS está na letra:**

- A) Somente a II.
- B) Somente a I e III.
- C) Somente a IV.
- D) Somente a I.
- E) Somente a II e IV.

**34. Relacionado à nutrição na gestação, é INCORRETO afirmar:**

A) O caroteno e a vitamina A atravessam a barreira placentária e o feto armazena essa vitamina, justificando a recomendação de consumo diário de 1000UI extras de retinol.

B) A deficiência de folato impede a divisão celular e a síntese proteica. Na gestação, além da anemia megaloblástica, somam-se os defeitos de fechamento de tubo neural no feto. As gestantes epiléticas em uso de anticonvulsivantes tem risco ainda maior, em função da redução no folato induzida por essas drogas.

C) A anemia materna por deficiência de ferro corresponde a 75% das anemias da gravidez, e é definida por hematócrito abaixo de 32% e por níveis de hemoglobina abaixo de 11mg/dl. O tratamento é a suplementação de ferro com 60 a 120mg/dia. Após a normalização mantém-se a dose de 30 mg/dia de ferro.

D) As causas mais comuns de diarreia na gestação são os patógenos contaminantes da água ou de alimentos. A *salmonelose* por exemplo e a hepatite A, podem ser transmitidas pela ingestão de água contaminada.



E) A paciente com hiperêmese gravídica pode levar a alcalose metabólica hiperclorêmica, mas se a perda hídrica evoluir, com depleção de volume, a acidose poderá sobrevir.

**35. Relacionado ao exame colposcópico, leia atentamente e após assinale o que se pede:**

I - Os condilomas acuminados da vagina, geralmente, podem ser observados à inspeção especular como lesões sésseis ou como projeções em dedos de luva.

II - O colo na gestação apresenta-se mais hiperemiado e congesto, de coloração azulada ou vermelha clara a pálida, com vasos sanguíneos ectásicos e relevo papilas acentuado.

III - Alguns microorganismos tais como Chlamydia trachomatis e herpes simples podem induzir metaplasia atípica, tornando o epitélio metaplásico mais susceptível a infecção causadas por papilomavirus humano – HPV.

IV - Em análise de exame a especificação do grau está relacionada: 1º grau – epitélio branco tênue, mosaico e pontilhado regular, leucoplasia tênue; 2º grau – epitélio branco espesso, mosaico e pontilhado irregulares, leucoplasia espessa, vasos atípicos.

V - A leucoplasia de superfície lisa e áspera, corresponde o epitélio escamoso nativo metaplásico ou displásico que exibe queratinização normal em sua superfície devido a estímulos crônicos inflamatórios, irritativos ou traumáticos.

**Os itens que contemplam as afirmações INCORRETAS estão contempladas na alternativa:**

- A) III e V.
- B) I e II.
- C) II e V.
- D) I e IV.
- E) II e III.

**36. O ciclo menstrual apresenta complexa dinâmica hormonal entre o eixo hipotálamo-hipófise – ovários. Relacionado à endocrinologia em mulheres, assinale a alternativa CORRETA.**

A) Os sintomas decorrentes da insuficiência lútea podem ser variados. Na maioria dos casos, pode haver sangramentos irregulares, em geral associados à infertilidade, ou ainda queixas mamárias, além de secura vaginal e dispareunia.

B) O ciclo menstrual pode ser dividido funcionalmente em três fases: folicular, ovulatória e lútea, nas quais se observam variações nos níveis dos fatores de liberação, das gonadotropinas e dos epitélios sexuais, que permitem caracterizar cada uma destas fases.

C) A hiperplasia uterina é observada frequentemente relacionada com a dismenorrea primária.

D) Antecedentes de doença inflamatória pélvica recidivante, anovulação, metrorragia, uso de DIU, infertilidade, dispareunia e cirurgia pélvica anterior apontam para dismenorreia secundária. Em caso de endometriose 50 a 90% das pacientes apresentam dismenorreia, associada a fluxo menstrual pequeno e curto.

E) Com o avançar da idade, portanto, os compartimentos teca-folicular e lúteo vão aumentando a produção, restando funcionalmente ativo apenas o estroma, o qual produz quase que exclusivamente androgênios (androstenediona e testosterona).

**37. Relacionado à anemia na mulher associe os itens abaixo a seu significado e/ou característica clínica.**

I - anemia microcítica hipocrômica

II - anemia macrocítica

III - anemia de Fanconi

IV - anemia por transtorno de absorção

( ) Esta refere-se à presença de glóbulos vermelhos (GVs) aumentados em uma amostra de laboratório. Esse achado é muitas vezes o único sinal de que um paciente está experimentando uma deficiência de vitamina B12 ou folato, dois nutrientes importantes para a saúde do sistema nervoso.

( ) Esta caracteriza pela diminuição do VCM com níveis abaixo e diminuição da HCM, que se traduz no exame morfológico pela presença de uma população eritrocitária hipocrômica.

( ) Neste tipo de anemia encontram-se a anemia perniciosa que pode resultar de fatores hereditários. Anemia perniciosa congênita é herdada como um distúrbio autossômico recessivo. É um tipo de anemia que origina má absorção de vitamina B12 devido a falta de fator intrínseco nas secreções gástricas, geralmente causada por atrofia gástrica com destruição das células parietais que são responsáveis pela secreção de ácido clorídrico e do fator intrínseco.

( ) De origem genética, caracteriza-se por apresentar sintomas como anomalias nos dedos e na face. Pode ser diagnosticada por volta dos 6 anos de idade, ao observar os sinais clínicos da doença. Seu tratamento é feito com transplante de medula óssea e com imunossupressores.

**A alternativa que contempla a ordem CORRETA está na letra:**

A) III, I, II, IV.

B) I, III, II, IV.

C) IV, II, III, I.

D) II, III, I, IV.

E) II, I, IV, III.

**38. Alguns fatores estão relacionados a área técnica da saúde da mulher. Referente a assistência a mulher leia atentamente as afirmativas, coloque nas questões V (verdadeiro) quando a afirmação for correta e F (falso) quando a afirmação for falsa. Após assinale a questão que contempla a ordem correta das alternativas.**

- ( ) As massas císticas na parede vaginal são incomuns e podem se originar de processos congênitos como cistos dos ductos de Gartner ou adquiridos como os cistos de inclusão epitelial.
- ( ) A secura vaginal se apresenta pela perda da umidade vaginal normal resultando em irritação, prurido, diminuição da sensibilidade dolorosa, durante a relação sexual.
- ( ) O prolapso vaginal pode derivar da perda da sustentação estrutural normal ocasionada por trauma (parto), cirurgia, elevação crônica da pressão intra – abdominal, como nos casos de emagrecimento.
- ( ) Distrofia vulvar hiperplásica causa um espessamento da pele vulvar nos grandes lábios, faze externa dos pequenos lábios e área do clitóris.
- ( ) A vaginite por Trichomonas, se apresenta por prurido ou queimação vulvar, secreção abundante sem odor fétido, geralmente com coloração esbranquiçada.
- ( ) A vaginite por Candidíase é uma manifestação muito comum em mulheres, com características semelhantes a vaginite por Trichomonas. A mulher com Candidíase pode manifestar secreção abundante de odor fétido, geralmente de coloração verde – amarelada a cinza, “bolhosa”.

**A CORRETA das alternativas de cima para baixo está na letra:**

- A) F, F, V, F, F, V.
- B) V, F, F, V, F, F.
- C) V, F, V, F, V, F.
- D) V, V, F, F, F, V.
- E) F, V, F, V, F, V.

**39. Relacionado às infecções do trato reprodutivo é INCORRETO afirmar:**

- A) A infecção por gonocócica é uma doença sexualmente transmissível, a cervicite aguda é a manifestação clínica mais frequente na mulher, o corrimento é pouco e mucopurulento, geralmente estão associadas a polaciúria, disúria, anemia e dispareunia.
- B) As endometrites são raras, nos casos agudos podem produzir secreção de aspecto purulento, e as endometrites crônicas, secreção serosa.
- C) O marco da vaginose bacteriana é o corrimento associado ao odor de peixe podre, que pode ser espontâneo ou evidenciado pelo teste do hidróxido de potássio adicionado ao esfregaço em lâmina de vidro, também conhecido como *whiff teste* u teste do cheiro, *sniff teste* ou teste da fungada, ou ainda teste das aminas.

D) Nas candidíases a alta incidência da espécie albicans deve-se a sua capacidade de aderir firmemente aos receptores da célula vaginal através de uma proteína denominada adesina.

E) Nas candidíases a reinfecção pode ocorrer a partir dos chamados reservatórios, por exemplo, o próprio intestino da paciente ou o parceiro infectado.

**40. Leia atentamente as questões e após assinale o que se pede:**

I - A lubrificação vaginal formada durante a fase de excitação do ciclo sexual em mulheres provem do transudato das paredes da vagina;

II - Os anti-hipertensivos, antidepressivos, contraceptivos orais, os anti-histamínicos e os antidiabéticos, são medicamentos que interferem com a função sexual;

III - Uma mulher de 53 anos notou o início recente de fogachos e dispareunia. Sua última menstruação foi a seis meses. Neste caso, a causa provável desta dispareunia é a infecção das glândulas de Bartholin;

IV - Uma mulher de 20 anos, queixa-se de corrimento vaginal purulento uma semana após ter mantido relações sexuais pela primeira vez com um novo namorado. O parceiro relatou a ela que estava sentindo queimação ao urinar. Ela está assintomática. No exame de cultura apresentou gonorréia. Nega alergias. Neste caso o tratamento indicado foi cefixina;

V - Histologicamente, a doença de Paget da vulva é uma doença das glândulas apócrinas.

**Os itens INCORRETOS estão contemplados na alternativa:**

A) IV e V.

B) I e III.

C) II e III.

D) I e IV.

E) III e V.

## RASCUNHO DE GABARITO

	A	B	C	D	E
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

	A	B	C	D	E
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

